

LA GRAN BIENVENIDA

Una guía para el parto de yeguas: Como estar preparado y que esperar.

Por Andrea Caudill

DE ACUERDO CON EL RELOJ DE LA MADRE NATURALEZA, 340 DÍAS después de que su valiosa yegua de crianza haya sido cruzada con su cuidadosamente escogido parejo, usted deberá recibir un diminuto y despelucado bultito de felicidad (el cual consiste principalmente de largas patas).

Obviamente, cada yegua tiene su propio calendario de parto – lo que significa que éste puede ocurrir en cualquier momento entre los 330 y los 350 días después del momento de la fecundación. Esto varía dependiendo de cada yegua y de la época del año – aquellas cruzadas al principio del año tienden a tener un período de preñez más largo en comparación con aquellas cruzadas en épocas más tardías del año. Las yeguas generalmente paren en la noche y son capaces de retrasar el inicio del parto hasta que que están en un ambiente confortable.

La mayoría de los nacimientos ocurren sin incidentes. En casos muy raros cuando algo no marcha bien, el contar con la adecuada asistencia a menudo marca la diferencia entre la vida y la muerte de la yegua y el recién nacido. Por ello, siempre debe de haber un encargado observando el parto y listo para asistir a la yegua en caso de que ésta lo necesite.

El estar preparado para el nacimiento, incluye el asegurarse de que la yegua está al corriente en su cuidado veterinario, incluyendo la desparasitación y las vacunas. Los encargados deberán tener también listo el equipo necesario, éste incluye una linterna, tijeras de punta redonda, toallas, bolsas de basura, guantes plásticos de manga larga para la examinación, gel lubricante, jabón suave, tintura de yodo (iodina), polvos antisépticos, dos enemas y un termómetro. Otros artículos que se pueden utilizar son los sistemas de monitoreo por video (para ver a la yegua a través de una videocámara sin perturbarla), el teléfono celular o móvil con los debidos números de emergencia y una dosis congelada de calostro (la primera leche lactada por la yegua, la cual está llena de anticuerpos). Si no le es posible a una yegua producir la leche adecuada, se necesitará administrarle al potrillo el calostro lo más pronto posible; dentro de las 24 horas el potrillo pierde la habilidad para ingerir los anticuerpos que necesita y que le ayudarán a sobrevivir.

Entonces, ¿qué es un parto normal?

LA LABOR DEL PARTO SE DIVIDE EN TRES ETAPAS. LA PRIMERA ETAPA comprende los cambios ocurridos en el cuerpo de la yegua (el

Tome Nota

Después del parto, tanto la madre como el potrillo deben ser examinados por un médico veterinario lo más pronto posible para asegurarse de que todo está bien. Entre las cosas de las cuales hay que tomar nota está la descripción del parto; la hora del nacimiento; la hora en que la placenta fue expulsada; qué tanto le tomó al potrillo para ponerse de pie y empezar a mamar; cuándo fue tratado el cordón umbilical; el lapso de tiempo y la frecuencia de las amamantadas; si y cuándo un enema le fue proporcionado al potrillo y la hora de la primera defecación.

ablandamiento y el ensanchamiento de los músculos) cuando se prepara para el nacimiento y el cambio de posición del potrillo de la posición de descanso (con su dorso en el útero) a su posición de nacimiento (posición de clavado con la cabeza primero y entre las extremidades delanteras). La segunda etapa es el nacimiento del potrillo, seguida de la tercera etapa la cual es el expulsamiento de la placenta. Una vez nacido el potrillo, éste deberá ponerse de pie y empezar a mamar.

Las yeguas de crianza con experiencia normalmente paren sin ninguna complicación y pueden ser atendidas por sus propietarios los cuales deben tener a la mano, los números de emergencia de los médicos veterinarios o de alguien con experiencia en partos de yeguas. Entre las yeguas que presentan riesgo están las primerizas (las cuales son impredecibles debido a su inexperiencia), las yeguas de avanzada edad (debido a su avejentado tracto reproductivo) y aquellas con pasados problemas durante el parto. Estas yeguas es mejor ponerlas en manos de aquellos con experiencia en partos o en manos de un médico veterinario.

En la siguiente página encontrará un diagrama de las etapas de un parto normal, incluyendo los problemas comunes a los cuales hay que poner atención. Este diagrama es suministrado solamente como una guía general y no incluye todo lo que puede pasar durante el parto. Los períodos de tiempo indicados en el diagrama son promedios y pueden variar dependiendo del equino. Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación, le recomendamos contactar a su médico veterinario. ■

An English version of this story appeared in the January 2006 issue.



1RA ETAPA DEL PARTO

(2-8 horas) La yegua se muestra intranquila – contracciones leves, agitación, mordiendo los lados, movimiento brusco del vientre, sudoración, nivel inusual del sentido de alerta.

¿Señales de cólico?

Si la yegua muestra señales de cólico que no se solucionan caminándola y el parto no progresa, ella puede estar sufriendo de tensión uterina. Llame al médico veterinario.

Rompimiento de la fuente.

Si la fuente no se rompe

Si la fuente no se rompe, pero emerge la parte roja de la placenta (parto con rotura prematura de membranas) – esto significa que la placenta se desprendió antes y el potrillo carece de oxígeno. Abra la placenta y acelere el parto halando durante las contracciones. Si el potrillo está débil, llame al médico veterinario.

2DA ETAPA DEL PARTO

(20-30 minutos) Nacimiento del potrillo. Las yeguas algunas veces se ponen de pie y se sientan repetidas veces para ayudar a colocar al potrillo en la posición correcta.

Si solamente aparece una extremidad delantera o no aparece la nariz.

Introduzca la mano con un guante en el interior de la vagina e intente localizar la extremidad o nariz ausente y manipúlelas hacia delante.

El potrillo aparece en “posición de clavado” con la nariz entre las extremidades delanteras – con una pata un poco más adelante que la otra.

Cualquier otra presentación.

Llame al médico veterinario. Mientras espera, haga que la yegua se ponga de pie – esto podría ayudar a reposicionar al potrillo. De lo contrario, busque ayuda.

La yegua deberá empezar a pujar para que el potrillo salga dentro de los 10 minutos después de su aparición.

Si no

Anime a la yegua a pujar suministrando halones firmes pero suaves de las extremidades del potrillo, tomándolas sólo por encima del menudillo. Hale solamente durante las contracciones y pare de halar cuando ella descanse.

Los hombros son la parte más ancha y difícil. La yegua normalmente tomará un receso antes de volver empezar a pujar.

Si no hay progreso

Llame al médico veterinario. Es posible que la yegua necesite ayuda para extraer el potrillo.

En tan sólo unos minutos después del parto, el potrillo deberá girar apoyándose en su esternón y tomar su primer aliento.

Si no

Si el potrillo tiene un ritmo cardíaco acelerado, suminístrele CPR (maniobra de resucitación cardiopulmonar) limpiando sus vías respiratorias y soplando en los ollares. Si el ritmo cardíaco es débil, haga presión sobre el pecho (un soplo por cada cinco compresiones) hasta que el médico veterinario llegue.

3RA ETAPA DEL PARTO

(30-120 minutos) Recuperación y expulsión del tejido placentario.

POTRILLO

El cordón umbilical usualmente se rompe cuando la yegua o el potrillo se ponen de pie o se mueve alejándose uno del otro. No apresure este evento.

Si hay hemorragia (sangrado)

Si se presenta un continuo flujo de sangre, presione desde la base y apriete hasta que el sangrado cese.

YEGUA

Desinfecte el ombligo aplicando la tintura de yodo con una jeringa o pistola.

Después del nacimiento, la yegua tomará un corto descanso y después le dará la bienvenida a su potrillo, hociéndolo y limpiándolo.

El potrillo deberá desarrollar su reflejo de succión dentro de los 45 minutos y ponerse de pie dentro de la hora después de nacido.

Si el potrillo se comporta de una manera anormal o se ve decaído, llame al médico veterinario.

Ella deberá expulsar toda la placenta. La retención de la placenta puede causar una seria infección. Si no ha sido expulsada en tres horas, llame al médico veterinario. Puede estar atorada pero nunca intente halar para sacarla – esto le causará daño a la yegua. Una vez haya salido, consérvela para que el médico veterinario la examine.

El potrillo deberá empezar a mamar dentro de las 3 horas después de nacido.

Si el potrillo mama pero no se acomoda (se pone de pie y se adormece), puede ser que la yegua no tenga suficiente leche. Verifique que tenga suficiente cantidad de leche, si no es así, déle al potrillo el calostro.

Un simple desgarro perineal (vaginal) no es una emergencia y puede ser tratado al siguiente día. Si el desgarro va hasta el recto (ano), llame al médico veterinario inmediatamente.

El potrillo deberá eliminar el meconio (las primeras heces fecales).

Si el potrillo hace fuerza y levanta la cola tratando pero sin poder defecar, suminístrele un enema. Si el potrillo no defeca dentro de los 15 minutos, suminístrele otro. Si el potrillo sigue haciendo fuerza sin poder defecar, puede estar sufriendo de un bloqueo. Llame al médico veterinario.